

Wirtschaftsvolk (& Maischwarm)

Drohnenrahmen schneiden

so oft wie möglich,
je öfter, desto besser



Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 10 Varroa/Tag:
eine gut wirksame Kurzzeit-Behandlung mit
Ameisensäure durchführen

Wenn unter 10 Varroa/Tag, NICHT
behandeln, so Brut und Bienen schonen!

sondern
entweder
**„Teilen &
Behandeln“**
= noch spät
Völker
vermehrten,
Varroa-
Behandlung
mit Oxalsäure

oder
Abwarten bis Mitte August
sodann **Start Spätsommerpflege**
= Einengen durch Entnahme des
unteren Brutraums (Waben-
hygiene), direkt folgend eine gut
wirksame AS-Kurzzeit-
Behandlung, danach Einfütterung

Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 5 Varroa/Tag:
eine weitere gut wirksame Kurzzeit-Behandlung mit
Ameisensäure durchführen

Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei Milbenfall
von **über 1 Varroa/Tag:**
Restentmilbung
durch **Oxalsäure träufeln**
sonst keine
Behandlung nötig



Ableger

April
bis
Juli

in brutfreier Phase
mit **Milchsäure**
einsprühen



Ende
Juli

Gemülldiagnose durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 5 Varroa/Tag:
eine gut wirksame Kurzzeit-
Behandlung mit **Ameisensäure**
durchführen

Wenn unter 5 Varroa/Tag, NICHT
behandeln, so Brut und Bienen
schonen!

ab
Mitte
Au-
gust

Bis Anfang September weiterhin
nur etwas füttern, entwickeln und
Waben ausbauen lassen.
Dann Winterauffütterung.

Mitte
Sept

Gemülldiagnose durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 1 Varroa/Tag:
eine gut wirksame Kurzzeit-
Behandlung mit **AS** durchführen

Ende
Nov
bis
Mitte
Dez

Gemülldiagnose durchführen

Bei **über**
1 Varroa/Tag:

Restentmilbung
durch **OS**
träufeln

sonst keine
Behandlung nötig

